Click Here

La tamsulosina es un fármaco indicado para el tratamiento de los síntomas urinarios en hombres asociados a la hiperplasia prostática benigna, ya que ayuda a relajar los músculos de la vejiga y la próstata, mejorando así el flujo urinario y facilitando la micción. Este medicamento debe ser utilizado con indicación médica y puede encontrarse en farmacias en forma de comprimidos o cápsulas de 0,4 mg, con el nombre comercial Asoflon, Amzuvag, Uprosol, Tamsulon, Hipebe, Reduprost, por ejemplo, o en su forma genérica como clorhidrato de tamsulosina. La tamsulosina también se puede encontrar asociada a otra sustancia, la dutasterida, indicada para reducir el volumen de la próstata y aliviar los síntomas provocados por su agrandamiento, como la retención urinaria, debiendo también ser utilizado bajo la orientación del médico tratante. Algunos nombres comerciales en este caso es el Asoflon Duo o Tamsulon Duo. Para qué sirve La tamsulosina está indicada para el tratamiento de los síntomas urinarios causados por la hiperplasia prostática benigna en hombres con agrandamiento de la próstata. Vea cómo identificar los síntomas urinarios de la hiperplasia prostática benigna. Este medicamento actúa relajando los músculos de la vejiga y la próstata, facilitando el flujo de la orina, lo que facilita la micción. Dosis (tamsulosina 0,4 mg) La dosis recomendada es de 1 cápsula o comprimido de 0,4 mg de tamsulosina una vez al día. La tamsulosina debe tomarse por vía oral, una vez al día y siempre a la misma hora, después del desayuno y durante el tiempo que indique el médico. Si la persona olvida tomar la dosis a la hora indicada, debe tomarla tan pronto como se acuerde, pero si está cerca de la hora de la siguiente dosis, debe omitir la dosis omitida y esperar a la siguiente hora para tomarla. eso. En ningún caso se debe duplicar la dosis para compensar la dosis olvidada. Posibles efectos secundarios Algunos de los efectos secundarios más comunes que pueden ocurrir durante el tratamiento con tamsulosina son mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor de pecho, palpitaciones, presión arterial baja, somnolencia, insomnio, debilidad, eyaculación anormal o disminución de la cantidad de semen, disminución del interés sexual o síntomas de rinitis como goteo o congestión nasal, dolor de cara, dolor de garganta o tos. También se le recomienda buscar ayuda médica inmediata o la sala de emergencias más cercana si experimenta síntomas de alergia a la tamsulosina, como dificultad para respirar, sensación de opresión en la garganta, hinchazón en la boca, la lengua o la cara, o urticaria. Vea cómo identificar los síntomas de una reacción alérgica. Tamsulosina efectos sexuales Además de los efectos secundarios mencionados anteriormente, la tamsulosina puede causar una erección dolorosa del pene que puede durar 4 horas o más, por lo que es importante buscar ayuda médica si experimenta este efecto secundario. Es importante recalcar que este medicamento no debe ser utilizado para esta finalidad. Contraindicaciones La tamsulosina no debe ser utilizada por mujeres, por niños menores de 16 años o por personas que padezcan insuficiencia hepática grave, hipotensión ortostática o que sean alérgicas a la tamsulosina o a cualquier otro componente de la fórmula. Además, este medicamento no debe ser utilizado por personas que estén en tratamiento con ketoconazol u otros medicamentos de acción similar a la tamsulosina, como alfuzosina, doxazosina, prazosina, silodosina o terazosina, por ejemplo. health centersmen's health center Tamsulosin is an oral drug for the treatment of men who are having difficulty urinating because of enlarged prostates from benign prostatic hyperplasia (BPH). Although tamsulosin is an alpha-blocker, it is not approved for the treatment of high blood pressure. In men, the tube which carries urine from the bladder through the penis (called the urethra) passes through the prostate gland. As men get older, the prostate gland enlarges, and the muscle cells within the prostate gland and the neck of the bladder (which controls the flow of urine) tighten. The combination of enlargement and tightening of muscles compresses the urethra and obstructs the flow of urine. This results in difficulty urinating and retention of urine within the bladder. The tightening or contraction of the muscle cells is controlled by nerves. One type of nerve, the alpha adrenergic nerves, cause the muscle cells to tighten by releasing a chemical related to epinephrine (adrenalin). Tamsulosin blocks the effects of this chemical on the muscle cells and causes the muscles to relax. This results in a decrease in obstruction to the flow of urine. There are other drugs that block alpha adrenergic nerves throughout the body and which are used in treating diseases of the heart, blood vessels, and prostate for example, prazosin (Minipress), terazosin (Hytrin), doxazosin (Cardura), and alfuzosin (Uroxatral). Tamsulosin is more active against the alpha adrenergic nerves of the prostate and bladder neck than these other drugs and has a lesser effect on alpha adrenergic nerves elsewhere in the body. For this reason, tamsulosin causes fewer side effects, especially low blood pressure, than other alpha adrenergic blocking drugs. Moreover, tamsulosin therapy can be started at the optimum dose whereas other alpha adrenergic blocking drugs need to be started at low doses with the doses slowly increased over time in order to minimize the side effects. The most common adverse effects of tamsulosin are Other side effects include More serious side effects of tamsulosin The following have been observed in male patients during tamsulosin treatment: orthostatic hypotension (low blood pressure when rising from sitting or lying down position), priapism (prolonged erection), and an eye problem called intraoperative floppy iris syndrome (IFIS). The recommended starting dose is 0.4 once daily about 30 minutes after the same meal time each day. When taken on an empty stomach, more of the medication is absorbed. This could cause a greater effect and potentially a drop in blood pressure. The dose may be increased to 0.8 mg once daily after 2 to 4 weeks if the response is not adequate. The capsules should not be crushed, chewed or opened. Signs of Prostate Cancer: Symptoms, PSA Test, Treatments See Slideshow The elimination of tamsulosin from the body may be reduced by: Reduced elimination may lead to increased side effects of tamsulosin. PDE-5 inhibitors (for example, vardenafil [Levitra, Staxyn], Adcirca, sildenafil [Viagra, Revatio], tadalafil [Cialis]) add to the blood pressure lowering effects of Flomax and may result in severe blood pressure reduction. Tamsulosin is not prescribed for women. This medication is used only in men. It is not known if tamsulosin is secreted into human milk. What preparations of tamsulosin) are available? How should I keep tamsulosin stored? Capsules should be stored at room temperature, 15 C to 30 C (59 F to 86 F). When was tamsulosin approved by the FDA? Tamsulosin was approved by the FDA in 1997. Procedures & Tests Doctor's Views Medications FDA Drug Labels on RxList.com By clicking "Submit," I agree to the MedicineNet Terms and Conditions and Privacy Policy. I also agree to receive emails from MedicineNet and I understand that I may opt out of MedicineNet subscriptions at any time. You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA. Visit the FDA MedWatch website or call 1-800-FDA-1088. See more info: tamsulosin on RxList Medically reviewed by John P. Cunha, DO, FACOEP; Board Certified Emergency Medicine REFERENCE: FDA Prescribing Information La tamsulosina es un fármaco indicado para el tratamiento de los síntomas urinarios en hombres asociados a la hiperplasia prostática benigna, ya que ayuda a relajar los músculos de la vejiga y la próstata, mejorando así el flujo urinario y facilitando la micción. Este medicamento debe ser utilizado con indicación médica y puede encontrarse en farmacias en forma de comprimidos o cápsulas de 0,4 mg, con el nombre comercial Asoflon, Amzuvag, Uprosol, Tamsulon, Hipebe, Reduprost, por ejemplo, o en su forma genérica como clorhidrato de tamsulosina. La tamsulosina también se puede encontrar asociada a otra sustancia, la dutasterida, indicada para reducir el volumen de la próstata y aliviar los síntomas provocados por su agrandamiento, como la retención urinaria, debiendo también ser utilizado bajo la orientación del médico tratante. Algunos nombres comerciales en este caso es el Asoflon Duo o Tamsulon Duo. Para qué sirve La tamsulosina está indicada para el tratamiento de los síntomas urinarios causados por la hiperplasia prostática benigna en hombres con agrandamiento de la próstata. Vea cómo identificar los síntomas urinarios de la hiperplasia prostática benigna. Este medicamento actúa relajando los músculos de la vejiga y la próstata, facilitando el flujo de la orina, lo que facilita la micción. Dosis (tamsulosina 0,4 mg) La dosis recomendada es de 1 cápsula o comprimido de 0,4 mg de tamsulosina una vez al día. La tamsulosina debe tomarse por vía oral, una vez al día y siempre a la misma hora, después del desayuno y durante el tiempo que indique el médico. Si la persona olvida tomar la dosis a la hora indicada, debe tomarla tan pronto como se acuerde, pero si está cerca de la hora de la siguiente dosis, debe omitir la dosis omitida y esperar a la siguiente hora para tomarla. eso. En ningún caso se debe duplicar la dosis para compensar la dosis olvidada. Posibles efectos secundarios Algunos de los efectos secundarios más comunes que pueden ocurrir durante el tratamiento con tamsulosina son mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor de pecho, palpitaciones, presión arterial baja, somnolencia, insomnio, debilidad, eyaculación anormal o disminución de la cantidad de semen, disminución del interés sexual o síntomas de rinitis como goteo o congestión nasal, dolor de cara, dolor de garganta o tos. También se le recomienda buscar ayuda médica inmediata o la sala de emergencias más cercana si experimenta síntomas de alergia a la tamsulosina, como dificultad para respirar, sensación de opresión en la garganta, hinchazón en la boca, la lengua o la cara, o urticaria. Vea cómo identificar los síntomas de una reacción alérgica. Tamsulosina efectos sexuales Además de los efectos secundarios mencionados anteriormente, la tamsulosina puede causar una erección dolorosa del pene que puede durar 4 horas o más, por lo que es importante buscar ayuda médica si experimenta este efecto secundario. Es importante recalcar que este medicamento no debe ser utilizado para esta finalidad. Contraindicaciones La tamsulosina no debe ser utilizada por mujeres, por niños menores de 16 años o por personas que padezcan insuficiencia hepática grave, hipotensión ortostática o que sean alérgicas a la tamsulosina o a cualquier otro componente de la fórmula. Además, este medicamento no debe ser utilizado por personas que estén en tratamiento con ketoconazol u otros medicamentos de acción similar a la tamsulosina, como alfuzosina, doxazosina, prazosina, silodosina o terazosina, por ejemplo.